



Arca de Noé

PROTECTORA DE ANIMALES

Si quieres que sea un gato sano no olvides mis vacunas y desparasitarme.



VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN EN GATOS

Calendario de vacunación



Si tenemos un gatito o estamos pensando en adquirirlo, es importante saber el proceso que debemos seguir para proteger al animal ante cualquier tipo de dolencia. Al poco tiempo de nacer, concretamente **40 días después**, tendremos que acudir al especialista para proceder a la desparasitación. Ésta consiste en la administración de una **pastilla** o de una **pasta especial**: resultará muy importante para la posterior vacunación.

Transcurridas nueve semanas de vida, se aplica una vacuna denominada **trivalente felina** que protegerá a nuestro animal contra la panleucopenia, la rinotraqueitis y el calcivirus felino. Quince días después se le inyectará la vacuna contra la leucemia felina, un mal muy peligroso que constituye una de las causas de mayor **mortalidad** en el mundo felino.

Pasado un mes exacto iremos de nuevo a nuestro veterinario para **revacunar** a nuestra mascota de las dos inyecciones nombradas anteriormente. Es importante que seamos conscientes de la relevancia de **cumplir las fechas señaladas** de forma precisa, pues de lo contrario se tendría que **volver al proceso inicial**.

Existen muchas enfermedades contra las cuales podemos vacunar en los gatos; el tipo de vacuna y pauta de la vacunación debe aconsejarla a su veterinario, dado que dependerá de:

- **Edad y raza del gato.** Si el gato se ha destetado tempranamente deberá vacunarse a las 9 semanas contra la Panleucopenia, Rinotraqueitis y Calicivirus, pero si tiene más de 3 meses, se lo puede inmunizar contra un mayor número de enfermedades en la misma vacunación. Las enfermedades de mayor riesgo para los gatitos jóvenes son la Panleucopenia, la Rinotraqueitis y el Calicivirus, y son las primeras que deben administrarse. En cuanto a la raza, las razas braquicefalas como el Persa, al tener una nariz más corta, pueden presentar un elevado riesgo a sufrir Rinotraqueitis y Calicivirus, por lo que deben ser vacunados especialmente contra estas enfermedades víricas.
- **Estado inmunológico por del gato.** Si el gatito estaba tomando la leche materna en el momento de adquirirlo, deberemos esperar unas semanas (2-3) hasta vacunarlo para evitar que los anticuerpos de la vacuna se solapen con los que le ha proporcionado la leche materna, pudiendo anular el efecto de ambas, quedando el gato sin protección alguna. También debe considerarse si la madre estaba correctamente vacunada y desparasitada, es decir, en un buen estado inmunitario, ya que eso será un seguro de las defensas del gatito. Si el gato está correctamente alimentado (y su madre), con un peso corporal correcto, es más probable que su estado inmunológico sea óptimo y, en caso de infección vírica o bacteriana, pueda plantar cara a estas infecciones.
- **Zona geográfica en la cual habite el gato.** Determinadas áreas geográficas presentan una mayor prevalencia de enfermedades tales como Panleucopenia o Leucemia ... En zonas rurales, en las cuales no todos los animales están vacunados adecuadamente, o en áreas en las cuales existen gatos asilvestrados, el riesgo de enfermedades víricas es mayor, y la vacunación debe ser completa. Su veterinario habitual le recomendará el protocolo adecuado en función de cada situación concreta.
- **Hábitos del gato.** Si el gatito debe convivir con otros gatos, ya sea porque se dedicará a competiciones de belleza o las cuales viven en planteles, presentan un mayor riesgo de contraer enfermedades víricas, y su vacunación debe ser estricta y completa. Si el gatito tendrá la oportunidad de salir al exterior de casa o de relacionarse con gatos del exterior (porque tenemos jardín o para vivir en una vivienda baja), es aconsejable evitarlo, ya que los gatos merodeadores suelen ser portadores de virus (Leucemia, PIF, FIV ...) y pueden contagiar a través de la saliva, sangre, etc. sus letales virus en nuestra mascota.

Los gatos con un deficiente estado inmunológico deberán seguir unas pautas vacunales más completas para poseer suficientes defensas.

Los gatos que acudan a exposiciones o se dediquen a la cría o que convivan con más gatos (planteles, residencias ...) deben ser especialmente inmunizados contra la Clamydia, PIF ...

Los gatos que estén o puedan estar en contacto con gatos merodeadores - no vacunados-, deben vacunarse frente las vacunas habituales incluyendo Leucemia y PIF.

Quienes mejor nos puede aconsejar la pauta vacunal de un gatito es el veterinario, ya que analizará las características individuales de cada gato y escogerá la que más lo proteja.


En rasgos generales, podríamos recomendar el siguiente calendario vacunal -pero recordamos que cada gato puede requerir vacunaciones adicionales:

Edad	Protección
30 días	Desparasitación interna
60 días	1ª Trivalente + desparasitación interna
80 días	Leucemia Felina
100 días	2ª Trivalente + Leucemia+Clamideas+desparas. interna
100 días	Es aconsejable implantar el microchip a esta edad para localizar más fácilmente al animal, en caso de pérdida. Recordemos que el microchip es obligatorio en perros, gatos y hurones
6 meses	Rabia
Anual	Rabia/ Trivalente+ Leucemia+Clamideas

IMPORTANTE:

CONSULTAR SIEMPRE A SU VETERINARIO SOBRE EL CALENDARIO DE VACUNACION DE SU GATITO Y SOBRE LA CONVENIENCIA DE VACUNAR CONTRA P.I.F.

CADA ANIMAL Y SUS CIRCUNSTANCIAS DEBERÁN SER TENIDOS EN CUENTA POR LOS VETERINARIOS Y ELLOS ACONSEJARAN LO MAS CONVENIENTE PARA CADA UNO.



Revacunaciones anuales de Triple vírica y/o otras enfermedades víricas.



La desparasitación

Al llegar un gatito a nuestra casa lo primero que debemos hacer con es desparasitarlo. Los parásitos afectan la salud del felino y existe el riesgo que puedan transmitir enfermedades a las personas de la casa, especialmente a los niños y a los ancianos.

Existen los **parásitos internos** (lombrices y tenias) y **parásitos externos** como las pulgas y las garrapatas.

Se define como parásitos a los organismos que viven a expensas de otros. Algunos pueden ocasionar enfermedades, a los animales y a los seres humanos.

¿Como se contagian los parásitos?

Los parásitos se contagian principalmente a través de cuatro vías:

- Durante el período de lactancia los gatitos reciben larvas a través de la leche de la gata. Como por ejemplo las ascárides
- Al alimentarse con material contaminado o cuando cazan y comen pájaros o ratones.
- Por penetración de larvas de parásitos a través de la piel del gato.
- Al ingerir involuntariamente pulgas o restos de pulgas infectadas.

Parásitos internos:

En términos generales un gato no debería estar más de tres o cuatro meses sin una correcta desparasitación. Por ello los veterinarios recomiendan desparasitar a los gatitos en la segunda o tercera semana de vida, ya que si la madre tenía parásitos es probable que se los haya traspasado a sus hijos a través de la placenta.

Casi todos los parásitos internos viven en los intestinos de los gatos donde se alimentan y reproducen.

Entre los parásitos encontramos las anquilostomas que se aferran a la pared del intestino y chupan la sangre del gatito. Si el gato está afectado severamente, puede morir en sólo dos semanas, a causa de la anemia que causan estos parásitos.

Están también las ascárides o áscaris, las que producen el gato apatía, pérdida de peso, una panza prominente y problemas digestivos.

Los parásitos internos se combaten con gotas, jarabes o comprimidos (cápsulas, pastillas) y las dosis dependen de lo recomendado por el Veterinario.

Hay que ser constante y seguir las indicaciones del Veterinario.

En lugares rurales no es aconsejable que el gato ingiera vísceras crudas, pues podría contagiarse de tenias, que son peligrosas para él y para el ser humano.

Los síntomas más claros de que nuestra mascota tiene parásitos internos son, en los animales pequeños, un abdomen demasiado abultado (en comparación con el resto del cuerpo) y en los gatos adultos, una delgadez acentuada sin causa aparente (el gato come pero no engorda).

Si hay síntomas y el gato se ve enfermo o decaído consulte al Veterinario.

A partir de los seis meses los gatos deben desparasitarse de por vida, cada tres meses.

Parásitos externos

Los parásitos externos más comunes son las pulgas y en el verano y en ciertas regiones, las garrapatas. Los síntomas de que nuestro gato tiene pulgas son fácilmente reconocibles, el gato se rasca insistentemente y en casos extremos hay caída de pelo y decaimiento, sobre todo si se trata de gatos pequeños.

Las garrapatas son menos comunes, pero si vive en una zona rural o en una gran ciudad donde exista una plaga de estos parásitos debe tener cuidado que su mascota no se contagie.

Si su gato tiene garrapatas no es bueno sacárselas ya que estas se agarran a su huésped con una especie de dientes, los que quedan en la piel del animal si las arrancamos bruscamente y les puede causar una infección. En este caso debe consultar con el Veterinario o en su defecto con farmacéutico sobre los productos adecuados para eliminarlas.

Lo mejor en este y en el caso de las pulgas es aplicar algún producto específico, previa consulta del Veterinario pues existen productos muy tóxicos.

No se deben colocar collares antipulgas en gatos menores de 4 meses y nunca se debe usar productos para perros sobre gatos ya que los gatitos son muy susceptibles y pueden causar intoxicaciones graves.

Existen productos antipulgas que permanecen un par de meses activos, son más caros, pero muy efectivos, normalmente vienen en gotas o en spray. Consulte en una farmacia veterinaria o Pet Shop sobre las distintas alternativas que existen para combatir las pulgas.

Fuentes: Affinity – Petcare y Mundo Felino.

